

CLAVICULAFRACTUUR

HUISARTSENVORLICHTING

Geachte collega,

Uw patiënt werd op geopereerd in verband met een midschacht claviculafractuur in het ziekenhuis te

Operatie: Plaatosteosynthese



Voorbeeld van plaatosteosynthese

Uw patiënt heeft in de eerste 2 weken een mitella tot er wondgenezing is opgetreden. Er is sprake van een oefenstabiele osteosynthese. De eerste 6 weken zal er onbelast moeten worden gemobiliseerd. Om een verstijving van de schouder te voorkomen moet patiënt draaioefeningen maken met de schouder. Tijdens de periode in de mitella is het verstandig tijdens de gehele periode zo nu en dan de arm uit de mitella te doen en de elleboog even te strekken. Algemene regel: "luister " naar de pijn. Alles wat mogelijk is, zonder dat dit pijn veroorzaakt, is toegestaan. Zware lichamelijke arbeid, waarbij de schouder veel wordt belast zijn in de eerste 6 weken zijn niet toegestaan. Contactsporten en sporten waarbij de schouder veel wordt belast zijn in de eerste 6 weken niet toegestaan.

Prognose van schouderfunctie (Constant Shoulder Score)

- 6 weken: 83,6%
- 3 maanden: 93,8%
- 12 maanden: 96,6%

Herstelduur

- 6-12 weken

Mogelijk complicaties

- Pseudoartose / non-union (niet genezen fractuur 52 weken na ongeval) (1,4%)
- Delayed union (niet genezen fractuur 24 weken na ongeval) (2,4%)
- Symptomatische malunion (0%)
- Infectie (4,2%)
- Irritatie van osteosynthese materiaal (13,2%)
- Falen van osteosynthese materiaal (breuk) (1,4%)
- Neurologische symptomen (prikkeling en compressie plexus brachialis) (5,6%)
- Re-fractuur (0,9%)

Poliklinische controle

De poliklinische controle zal plaatsvinden 2 en 6 weken na de operatie.

Graag telefonisch contact bij:

- 38,5 °C koorts of hoger;
- Als de wond abnormaal rood is, warm aanvoelt en/of er vocht uitkomt;
- Meer pijn in uw sleutelbeen die niet verdwijnt door pijnstillers;

Met vriendelijke groet,

....., arts-assistent

Namens,

....., traumachirurg / orthopeed